

下記のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

P.30 ◆事例関連図

⇒「手術後3日目」の最下部を変更

誤) 移乗能力障害 → 正) **歩行障害**

入浴セルフケア不足
排泄セルフケア不足
移乗能力障害 → 入浴セルフケア不足
排泄セルフケア不足
歩行障害

⇒「手術後10日目」に追加

「2回/日程度 動悸・気分不良」から
赤色の破線矢印を下に向かって延ばし、

『**栄養摂取消費バランス異常：必要量以下**』を追加。

2回/日程度
動悸・気分不良
↓
栄養摂取消費
バランス異常：
必要量以下

P.31 ◆データベース「手術後3日目」を下記に変更

手術後3日目

領域	データベース	看護診断
活動・運動パターン	<ul style="list-style-type: none"> 歩くと創部やドレーン挿入部の痛みが出現するが歩行に問題はない。 動くとき創部やドレーン挿入部の痛みが出るため、ベッドサイドにポータブルトイレを置いて使用している。 痛みが強い時は、支えが必要であるが、排泄行為には問題ない。 <p>ドレーン抜去までは入浴禁止となっているため、「入浴セルフケア不足」が考えられる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 歩行障害 排泄セルフケア不足 入浴セルフケア不足
認知/知覚パターン	<ul style="list-style-type: none"> 身体を動かすと創部やドレーン挿入部の痛みがあるため、ロピオン50mgとボンフェナック坐薬を用いて軽減している。 腹部の創部部分とドレーン刺入部に痛みがある。 手術後ずっと痛みは続き、動くときずきずきした痛みが出てくる。安静にしていると痛みはない。 	<ul style="list-style-type: none"> 急性疼痛 <p>創部やドレーン刺入部の痛みがあることから、「急性疼痛」が考えられる。</p>

P.31 ◆データベース「手術後10日目」に下記を追加

⇒栄養/代謝パターンのデータベース「・白血球数6,200/ μ L～」の後に

『**全粥軟菜食(分割食)が開始され、「量が少なくて時間がかけられない」と5分程度で食べている。**』を追加。

⇒栄養/代謝パターンのデータベース「・食後2時間ごろ～」に対応する項目として、看護診断に『**栄養摂取消費バランス異常：必要量以下**』を追加。